

FLUCAZOLE[®] 150 mg
Fluconazole
Gélu

COMPOSITION : p/gél

Substance active : Fluconazole150.00 mg

Excipients : Lactose monohydraté, cellulose microcristalline, silice colloïdale anhydre, amidon de maïs prégélatinisé, stéarate de magnésium, laurylsulfate de sodium, gélu en gélatine jaune/jaune n°0.

Composition de la gélu : gélu de quinoleine, jaune orangé, dioxyde de titane.

EXCIPIENTS A EFFET NOTOIRE :

Lactose, jaune orangé (E110).

FORME PHARMACEUTIQUE ET PRESENTATION :

Gélu ; Boîtes de 1 et 4.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE :

Antimycosique (Antifongique)

INDICATIONS :

FLUCAZOLE 150 mg est utilisé chez l'adulte pour traiter les infections dues à des champignons. La cause la plus fréquente des infections fongiques est une levure appelée Candida.

Votre médecin pourra vous prescrire ce médicament pour traiter une mycose génitale, une infection du vagin ou du pénis.

POSOLOGIE/ MODE D'ADMINISTRATION :

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien.

Les gélu ne sont pas indiqués chez l'enfant de moins de 6 ans, en raison de la forme pharmaceutique

Avalez la gélu entière avec un verre d'eau.

Vous pouvez prendre votre médicament au cours ou en dehors des repas.

Adultes

150 mg (1 gélu) en dose unique.

Patients âgés

La même dose que pour les adultes doit être administrée.

Patients présentant des problèmes aux reins

La même dose que pour les adultes doit être administrée.

Dans quel délai votre traitement commencera à agir ?

Mycose vaginale

Votre état devrait commencer à s'améliorer en quelques jours ; certaines femmes notent une amélioration dès le premier jour. Si votre état ne s'améliore pas en quelques jours, vous devez retourner voir votre médecin.

Mycose péniennne

Votre état devrait commencer à s'améliorer en quelques jours mais cela peut prendre jusqu'à une semaine.

Si votre état ne s'est pas amélioré après une semaine, vous devez retourner voir votre médecin.

CONTRE INDICATIONS :

Ne prenez jamais FLUCAZOLE 150 mg :

- Si vous êtes allergique au fluconazole, aux autres médicaments que vous avez pris pour traiter des infections fongiques ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.

- En cas d'association avec un médicament contenant de l'as-témizole, de la terféndine, du cisapride, du pimozide, de la quinidine ou de l'érythromycine.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre FLUCAZOLE 150 mg :

- Si vous avez des problèmes de foie ou de rein.

- Si vous souffrez d'une maladie du cœur, y compris des troubles du rythme cardiaque.

- Si vous avez des taux anormaux de potassium, de calcium ou de magnésium dans le sang.

- Si vous développez des réactions cutanées graves (démangeaisons, rougeurs de la peau ou des difficultés à respirer).

- Si vous développez des signes d'insuffisance surrénale (fatigue chronique ou prolongée, faiblesse musculaire, perte d'appétit, perte de poids, douleurs abdominales).

- L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

Enfants et adolescents

Bien que ce médicament soit destiné à l'adulte, il peut être utilisé chez l'adolescent (entre 12 et 17 ans) lorsqu'il est essentiel et qu'il n'existe aucune alternative thérapeutique adéquate. Il doit être pris de la même façon que chez l'adulte.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES :

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Prévenez immédiatement votre médecin si vous prenez de l'as-témizole, de la terféndine (un antihistaminique pour traiter les allergies) ou du cisapride (utilisé pour les maux d'estomac) ou du pimozide (utilisé pour traiter les troubles mentaux) ou de la quinidine (utilisée pour traiter les arythmies cardiaques) ou de l'érythromycine (un antibiotique pour traiter les infections) car ces produits ne doivent pas être pris avec FLUCAZOLE.

Certains médicaments peuvent interagir avec FLUCAZOLE. Veillez à prévenir votre médecin si vous prenez l'un des médicaments suivants :

- rifampicine ou rifabutine (antibiotiques destinés à traiter les infections)
- alfentanil, fentanyl (utilisés comme anesthésiques)
- amitriptyline, nortriptyline (utilisés comme antidépresseurs)
- amphotéric B, voriconazole (antifongiques)
- médicaments qui fluidifient le sang afin d'éviter la formation de caillots sanguins (warfarine ou médicaments similaires)
- benzodiazépines (midazolam, triazolam ou médicaments similaires) utilisées pour vous aider à dormir ou pour soulager une anxiété
- carbamazépine, phénytoïne (utilisées pour traiter les crises d'épilepsie)
- nifédipine, isradipine, amlodipine, féléodipine et losartan (contre l'hypertension artérielle)
- ciclosporine, évérolimus, sirolimus ou tacrolimus (pour prévenir le rejet du greffon)
- cyclophosphamide, vinca-alcaloïdes (vincristine, vinblastine ou médicaments similaires) utilisés pour traiter le cancer
- halofantrine (utilisée pour traiter le paludisme)
- statines (atorvastatine, simvastatine et fluvastatine ou médicaments similaires) utilisées pour réduire l'hypercholestérolémie

- méthadone (utilisée contre les douleurs)
- célecobix, flurbiprofène, naproxène, ibuprofène, lornoxicam, méloxicam, diclofénac (anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS))
- contraceptifs oraux
- prednisone (corticoïde)
- zidovudine, également connue sous le nom d'AZT ; saquinavir (utilisé chez les patients infectés par le VIH)
- médicaments contre le diabète tels que le chlorpropamide, le glibenclamide, le glipizide ou le tolbutamide
- théophylline (utilisée pour contrôler l'asthme)
- tofacitinib (utilisé pour traiter la polyarthrite rhumatoïde)
- vitamine A (complément nutritionnel)
- ivacafator (utilisé pour traiter la mucoviscidose)
- amiodarone (utilisée pour traiter les battements cardiaques irréguliers ou arythmies)
- hydrochlorothiazide (un diurétique).

GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Vous ne devez pas prendre FLUCAZOLE 150 mg pendant la grossesse sauf si votre médecin vous a autorisée à le faire. Vous pouvez continuer à allaiter après la prise d'une dose unique de 150 mg du fluconazole.

Vous ne devez pas allaiter si vous prenez des doses répétées de FLUCAZOLE.

EFFETS SUR LA CAPACITE A CONDUIRE DES VEHICULES ET A UTILISER LES MACHINES :

Lors de la conduite de véhicules ou de l'utilisation de machines, il faut tenir compte du fait que des vertiges ou des crises d'épilepsie peuvent survenir.

EFFETS INDESIRABLES

Quelques personnes développent des réactions allergiques mais les réactions allergiques graves sont rares. Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

Si vous ressentez l'un des symptômes suivants, prévenez immédiatement votre médecin.

- Sifflement respiratoire soudain, difficultés à respirer ou oppression dans la poitrine, gonflement des paupières, du visage ou des lèvres, rougeur de la peau avec démangeaisons sur tout le corps ou démangeaisons au niveau des taches rouges, éruption cutanée, réactions cutanées sévères telles qu'une éruption entraînant la formation de bulles (pouvant toucher la bouche et la langue).

FLUCAZOLE peut affecter votre foie. Les signes de problèmes hépatiques comprennent :

- De la fatigue, une perte d'appétit, des vomissements, un jaunissement de la peau ou du blanc des yeux (jaunisse)

Si l'un de ces signes survient, arrêtez de prendre FLUCAZOLE et prévenez immédiatement votre médecin.

Autres effets indésirables :

Par ailleurs, si vous ressentez un des effets mentionnés comme graves ou si vous présentez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Les effets indésirables fréquents (pouvant toucher jusqu'à 1

personne sur 10) sont :

- Maux de tête, maux d'estomac, diarrhée, nausées, vomissements, augmentations des tests sanguins liés au fonctionnement du foie, éruption.

Les effets indésirables peu fréquents (pouvant toucher jusqu'à 1 personne sur 100) sont :

- Réduction du nombre de globules rouges pouvant entraîner une pâleur de la peau et provoquer une faiblesse ou un essoufflement, diminution de l'appétit, impossibilité de dormir, sensation de somnolence, crise d'épilepsie, étourdissements, sensation de tourner, fourmillements, picotements ou engourdissement, modifications de la sensation du goût, constipation, difficultés à digérer, gaz, sécheresse de la bouche, douleurs musculaires, atteinte du foie et jaunissement de la peau et des yeux (jaunisse), papules, bulles (urticaire), démangeaisons, augmentation des sueurs, fatigue, sensation générale de malaise, fièvre

Les effets indésirables rares (pouvant toucher jusqu'à 1 personne sur 1 000) sont :

- diminution du nombre de globules blancs (cellules sanguines qui contribuent à combattre les infections) et des plaquettes (cellules sanguines qui contribuent à arrêter les saignements), coloration rouge ou violette de la peau pouvant être due à un faible nombre de plaquettes ou à d'autres modifications des cellules sanguines, modifications biochimiques sanguines (taux élevés de cholestérol, de graisses dans le sang), faible taux de potassium dans le sang, tremblements, anomalies à l'électrocardiogramme (ECG), modification de la fréquence ou du rythme cardiaque, insuffisance hépatique, réactions allergiques (parfois sévères), y compris éruption bulleuse généralisée et desquamation de la peau, réactions cutanées sévères, gonflement des lèvres ou du visage, perte de cheveux.

Les effets indésirables de fréquence indéterminée (ne pouvant être estimée sur la base des données disponibles) sont :

- Réaction d'hypersensibilité avec éruption cutanée, fièvre, apparition de ganglions enflés, augmentation d'un type de globules blancs (éosinophilie) et inflammation des organes internes (foie, poumons, cœur, reins et colon) (Réaction médicamenteuse ou éruption avec éosinophilie et symptômes systémiques (DRESS)).

SURDOSAGE

Contactez immédiatement votre médecin ou le service des urgences de l'hôpital le plus proche. Les symptômes d'un éventuel surdosage peuvent être d'entendre, de voir, de ressentir ou de penser des choses qui ne sont pas réelles (hallucinations) et comportement paranoïaque. Une prise en charge (avec un traitement symptomatique et un lavage d'estomac, si nécessaire) peut être nécessaire.

CONDITIONS DE CONSERVATION :

- A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

- Tenir hors de la portée des enfants.

LISTE I

DATE DE MISE A JOUR DE LA NOTICE : Février 1919

DE N° : 15/13R258/318

Fabricant, conditionneur et détenteur de la DE :

Laboratoires PHARMIDAL NS

144, ZI Le RHUMEL Constantine - ALGERIE

Tél./ Fax : 031 60 65 53/ 031 60 65 52

التركيب:

المادة الفعالة: فلوكوزالول150.00 مغ
سواغات: لكتوز أحادي الإماهة، سليولوز بلوري، سليكا غرواني
لاماني، نشاء الذرة الملهمن مسبقا، ستيرات المغنيسيوم، لوريل
سولفات سدوديوم، كبسولة الجيلاتين أصفّر/أصفر رقم 0.
تركيبة الكبسولة: جيلاتين، أصفر الكينوليين، أصفر برتقالي، ثاني
أكسيد التيتانيوم.
سواغات ذات تأثير معلوم: لكتوز، أصفر برتقالي (E110)
الشكل الصيدلاني و العرض:
كبسولة، علب ذات 1 و 4 كبسولات.
المضاد الدوائي العلاجي:
مضاد للفطريات

دواعي الاستعمال:

يستخدم فلوكازول 150 مغ لدى البالغين لعلاج الالتهابات التي
تسببها الفطريات. السبب الأكثر شيوعا للعدوى الفطرية هو
خميرة تسمى المبيضة.
قد يصف لك الطبيب هذا الدواء لعلاج الفطار التناسلي، عدوى في
المهبل أو القضيب.
الجرعة/ طريقة الاستعمال:
تناول دائما هذا الدواء تماما كما هو موضح في هذه النشرة أو
حسب توجيهات الطبيب أو الصيدلي.
لا توصف الكبسولات للأطفال دون سن 6 سنوات، بسبب الشكل
الصيدلاني.

ابتلع الكبسولة بأكملها مع كوب من الماء.
يمكنك تناول الدواء أثناء أو خارج وجبات الطعام.
الكبار
150 مغ (1 كبسولة) في جرعة واحدة.

المرضى المسنين
ينبغي إعطاء الجرعة نفسها التي تعطى للكبار.
المرضى الذين يعانون من مشاكل في الكلى
ينبغي إعطاء الجرعة نفسها التي تعطى للكبار.
متى يبدأ علاجي في العمل؟
فقط مهبلي.

يجب أن تبدأ حالتك بالتحسن في غضون أيام قليلة؛ بعض النساء
يلاحظن تحسنا من اليوم الأول.
إذا لم تحسن حالتك في غضون أيام قليلة، يجب عليك العودة
لرؤية طبيبك.
فطار القضيب
يجب أن تبدأ حالتك بالتحسن في غضون بضعة أيام ولكن قد
يستغرق ذلك إلى أسبوع.

إذا لم تحسن حالتك بعد أسبوع، فيجب عليك العودة لرؤية
طبيبك.
موانع الاستعمال:
لا تتناول فلوكازول 150 مغ:
• إذا كنت تعاني من حساسية من فلوكوزالول، من أدوية أخرى

تناولتها لعلاج الالتهابات الفطرية أو أي من المكونات الأخرى
لهذا الدواء.
• إذا كنت تتناول في آن واحد أستيemizol، ترفينادين، سيزابريد،
بيموزيد، كينيدين، إريثروميسين.
في حالة الشك، فمن الضروري استشارة الطبيب أو الصيدلي.
التحذيرات و احتياطات الاستعمال:

تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي قبل تناول فلوكازول 150 مغ:
- إذا كان لديك مشاكل في الكبد أو الكلى
- إذا كنت تعاني من أمراض القلب، بما في ذلك اضطرابات ضربات
القلب
- إذا كان لديك مستويات غير طبيعية من البوتاسيوم، الكالسيوم
أو المغنيسيوم في الدم
- في حالة حدوث فاعلات جلدية شديدة (حكة، احمرار في الجلد
وعصوبة أو التشنج)
- في حالة حدوث علامات قصور الغدة الكظرية، (التعب المزمن
أو فقرات طويلة، ضعف العضلات، فقدان الشهية، فقدان الوزن،
آلم في البطن) .

الأطفال والمراهقين

على الرغم من أن هذا الدواء مخصص للبالغين، فإنه يمكن
استخدامه لدى المراهقين (12 و 17 عاما) عندما يكون ذلك
ضروريا وليس هناك بديل علاجي كاف. يجب تناول هذا الدواء
بنفس الطريقة كما لدى البالغين.

في حالة الشك، لا تردد في طلب رأي طبيبك أو الصيدلي.
التداخلات الدوائية:
أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناول، قد تناولت مؤخرا أو قد
تتناول أي أدوية أخرى.

أخبر طبيبك على الفور إذا كنت تأخذ أستيemizol، ترفينادين
(مضادات الهيستامين لعلاج الحساسية) أو سيسابريد (المستخدم
في آلام المعدة) أو بيموزيد (تستخدم لعلاج الإضطرابات النفسية)
أو الكينيديين (تستخدم لعلاج عدم انتظام ضربات القلب) أو
الإريثروميسين (مضاد حيوي لعلاج الالتهابات) لأن هذه المنتجات
لا ينبغي أن تؤخذ مع فلوكازول.
قد تتفاعل بعض الأدوية مع فلوكازول. احرص على إخبار الطبيب

إذا كنت تتناول أي من الأدوية التالية:
• ريفامبسين أو ريفامبونين (المضادات الحيوية لعلاج العدوى)
• الفنتانيل، فنتانيل (يستخدم كمخدر)
• أميتريبتيلين، نورتريبتيلين (تستخدم كمضادات الاكتئاب)
• أمفوتريسين B، فوريكوزالول (مضادات الفطريات)
• الأدوية التي تخفف الدم لمنع تشكل جلطات الدم (الوارفارين
أو أدوية مماثلة)

• بنزوديابينات (ميدازولام، تريازولام أو أدوية مماثلة) تستخدم
لمساعدتك على النوم أو تخفيف القلق
• كاربامازيبين، فينيتوين (يستخدم لعلاج نوبات الصرع)
• نيفيديبين، إيراتدين، أملوديبين، فلوديدين و لوسارتان (الارتفاع
ضغط الدم)
• سيكلوسبورين، إيفيرليموس، سيروليموس أو تاركوليموس (لمنع
الرفض المناعي)

• سيكلوسفوساميد، فينكا كلوبات (فينكريستين، أبلستين أو
أدوية مماثلة) تستخدم لعلاج السرطان
• هالوفانتين (يستخدم لعلاج الملاريا)

• ستانينات (أنورفاستاتين، سيففاستاتين و فلوفاستاتين أو أدوية
مماثلة) المستخدمة للحد من ارتفاع الكوليسترول في الدم
• ميتادون (يستخدم ضد الآلم)
• سيليكوكسيب، فلوربيريفون، نابروكسين، إيبوبروفين،
لوموكسيكام، ميلوكسيكام، ديكولفيناك (مضادات الالتهاب الغير
الستيرويدية)

• موانع الحمل التي تؤخذ عن طريق الفم.
• برينديزون (كورتيكوستيرويد)
• زيدوفودين، المعروف أيضا باسم AZT ؛ ساكنافير (المستخدمة
لدى المرضى الذين يعانون من عدوى فيروس المناعي البشري)
• أدوية السكري مثل كلوربرومايد، غليبينكلاميد، جليبيزيد أو
توليوتاميد
• ثيوفيلين (يستخدم للسيطرة على الربو)
• توفاسيتينيب (يستخدم لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي)
• فيتامين A (مكمل غذائي)
• إنفكانفور (يستخدم لعلاج التليف الكيسي)
• أميودارون (يستخدم لعلاج عدم انتظام ضربات القلب أو
اضطراب النظم)
• هيدروكلوروثيازيد (مدر للبول).

الحمل والإرضاع:

إذا كنت حاملا أو ترضعين، تعتقدن أنك قد تكونين حاملا أو
تخططين لذلك، اطلي رأي طبيبك أو الصيدلي قبل تناول هذا
الدواء
يجب أن لا تتناولي فلوكازول 150 مغ أثناء الحمل إلا إذا سمح
الطبيب لك للقيام بذلك.
يمكنك الإستمرار في الرضاعة بعد أخذ جرعة واحدة ذات 150 مغ
من فلوكوزالول.

يجب أن لا ترضعي إذا كنت تتناولين جرعة متكررة من فلوكازول.
الأثرعلى القدرة على سياقة المركبات و استعمال الآلات:
عند القيادة أو استخدام الآلات، يجب الأخذ بعين الاعتبار إمكانية
حدوث دوخة أو نوبات الصرع.

التأثيرات الغير مرغوب فيها:

يمكن أن يحدث لبعض الناس حساسية و لكن التفاعلات الحساسية
الخطيرة نادرة. إذا حصل أي أثر جانبي، تحدث مع طبيبك أو
الصيدلي. وينطبق هذا أيضا على أي تأثير غير مرغوب فيه لم يرد
ذكره في هذه النشرة.

إذا واجهت أي من الأعراض التالية، أخبر طبيبك فورا.
- صفر تنفسي مفاجئ، صعوبة في التنفس أو ضيق في الصدر، تورم
الجفون، الوجه أو الشفاه، طفح جلدي مع حكة في جميع أنحاء
الجسم أو حكة على مستوى البقع الحمراء، طفح جلدي، تفاعلات
جلدية حادة مثل طفح مما يسبب في تشكيل فقاعات (و التي
يمكن أن تؤثر على الفم و اللسان).

يمكن أن يؤثر فلوكازول على الكبد. و تشمل علامات مشاكل الكبد:
- التعب، فقدان الشهية، القي، اصفرار الجلد أو بياض العينين
(اليرقان)
إذا حدث أي من هذه العلامات، توقف عن تناول فلوكازول و أخبر
طبيبك فورا.

الآثار الضارة الأخرى:

بالإضافة إلى ذلك، إذا حصل لك أي من الآثار الجانبية المذكورة
الخطيرة، أو إذا لاحظت أي آثار جانبية غير مدرجة في هذه النشرة،

يرجى إخبار الطبيب أو الصيدلي.

الآثار الجانبية الشائعة (تصل إلى 1 من 10 أشخاص) هي:
صداع، اضطراب في المعدة، إسهال، غثيان، قيء، زيادة اختبارات
الدم المتعلقة بوظيفة الكبد، طفح جلدي.
الآثار الجانبية قليلة الإنتشار (قد تؤثر على ما يصل إلى 1 من 100
شخص) هي:

انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء التي يمكن أن تسبب شحوب
الجلد و تسبب ضعف أو ضيق في التنفس، انخفاض الشهية، عدم
القدرة على النوم، الشعور بالتعاس، نوبات الإختلاج، الدوخة،
الإحساس بالدوار، نزع أو خدر، تغييرات في الذوق، الإمساك،
صعوبة الهضم، غازات، حرقان الفم، آلم في العضلات، تلف الكبد و
اصفرار الجلد و العينين (اليرقان)، حطاطات، فقاعات (شرى)، حكة،
زيادة التعرق، تعب، شعور عام بعدم الراحة، حمى.

الآثار الجانبية النادرة (حتى 1 من 1000 شخص) هي:
انخفاض عدد خلايا الدم البيضاء (خلايا الدم التي تساعد على
مكافحة العدوى) و الصفائح الدموية (خلايا الدم التي تساعد
على وقف النزيف)، تلون بالأحمر أو الأرجواني للجلد التي يمكن
أن يكون بسبب انخفاض عدد صفائح أو تغييرات خلايا الدم
الأخرى، التغيرات الكيميائية في الدم (ارتفاع مستويات الكوليسترول
و الدهون في الدم)، انخفاض البوتاسيوم في الدم، اضطرابات،
اختلالات في مخطط رسم القلب، تغيرات في معدل ضربات القلب
أو إيقاع القلب، فشل الكبد، الحساسية (في بعض الأحيان شديدة)،
بما في ذلك طفح قفاعي معمم و تقشر الجلد، تفاعلات جلدية
شديدة، تورم الشفاه أو الوجه، فقدان الشعر.

الآثار الجانبية غير معروفة الإنتشار (التي لا يمكن تقديرها من
البيانات المتاحة) هي:

تفاعل فرط الحساسية مع الطفح الجلدي، الحمى، ظهور الغدد
المتضخمة، زيادة نوع خلايا الدم البيضاء (كرة الیوزنات) و التهاب
الأعضاء الداخلية (الكبد، الرئتين، القلب، الكليتين و القولون)
(تفاعلات دوائية أو طفح جلدي مع كرة الیوزنات و أعراض
جهازية).

جرعة زائدة:

اتصل على الفور بطبيبك أو قسم الطوارئ في أقرب مستشفى.
الأعراض المحتملة للجرعة الزائدة قد تكون السمع، الرؤية، الشعور
أو التفكير في الأشياء التي ليست حقيقية (هلوسة و سلوك الزور).
التكفل (مع علاج الأعراض وغسل المعدة، إذا لزم الأمر) قد يكون
ضروريا.

شروط حفظ الدواء:

يحفظ في درجة حرارة لا تتجاوز 25°م
لا يتك في متناول الأطفال.
قائمة I

تاريخ مراجعة نشرة الإرشادات: فيفري 2019
مقرر التسجيل رقم: 15/13R258/318
مصنع و صاحب مقرر التسجيل:
مخابر فارميدال ن.س

144، المنطقة الصناعية الرمال قسنطينة - الجزائر
هاتف/ فاكس: 031 60 65 53/ 031 60 65 52